Modèle d'agro-écosystèmes LPJmL (Lund-Potsdam-Jena managed Land)

Alberte Bondeau

alberte.bondeau@imbe.fr

Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Ecologie marine et continentale (IMBE)

Equipe « Macroécologie et Biogéographie des Changements Globaux » (MacroBio)

ECCOREV
8 octobre 2014

LPJ

LPJ-DGVM: Dynamic Global Vegetation Model

(Sitch et al. 2003)

Modélisation du
fonctionnement de la
végétation naturelle potentielle

- 9 types fonctionnels de plantes
- Photosynthèse: cycles couplés CO₂ et H₂O
- Respiration autotrophe et hétérotrophe
- C allocation
- Pools de carbone (végétation: 4, litière + sol: 4)
- Hydrologie
- Compétition, mortalité, établissement
- Feux, permafrost

Structure de LPJ

- Structure modulaire
- Simulation démarre à partir du sol nu
 - aboutit à un équilibre entre le sol, la végétation et le climat pour chaque élément de la grille (1000 à 5000 ans de spinup nécessaires)
- Cycles fermés de l'eau et du carbone
 - Représentation mécaniste: photosynthèse, modèle de Farquhar généralisé
 - Représentation empirique: phénologie, degrés-jours

LPJ-DGVM

Production primaire nette

climate

résolution spatiale: 0.5°

texture du sol

Modèle LPJ-DGVM pour la végétation naturelle potentielle: biogéographie, cycles de l'eau et du carbone (Sitch et al. 2003, Gerten et al. 2004, Thonicke et al. 2010, Schaphoff et al. 2013)

Fréquence des feux

Distribution de la végétation

Carbone du sol

Ruissellement

LPJ-DGVMs

Réponse des écosystèmes terrestres à l'augmentation de $[\text{CO}_2]$ et au changement climatique

Intercomparaison de 6 DGVMs (Cramer et al. 2001):

L'augmentation de $[\text{CO}_2]$ génère un large puits, réduit par le changement climatique
=> nécessité de prendre en compte les rétroactions dans les modèles climatiques

Occupation des sols

Plus de 50% de la superficie terrestre potentiellement couverte de végétation est utilisée pour l'agriculture:

cultures ou prairies

Ramankutty et al. (2008)
Farming the Planet. 1: The Geographic Distribution of Agricultural Lands in the Year 2000

15.0 million km² of cropland
28.0 million km² of pasture

Agro-écosystèmes

Une profonde transformation des écosystèmes causée par l'homme:
l'Anthropocène

=> Impacts biophysiques sur le système sol-végétation-atmosphère

(Foley et al. 2003)

Agro-écosystèmes

=> Impacts biogéochimiques sur le système sol-végétation-atmosphère

Part de l'agriculture dans les émissions de gaz à effet de serre (CO₂, CH₄, N₂O)

Energy emissions are mostly CO₂ (some non-CO₂ in industry and other energy related). Non-energy emissions are CO₂ (land use) and non-CO₂ (agriculture and waste).

Stern Review on the Economics of Climate Change (2006)

Agriculture dans LPJ-DGVM

LPJmL (LPJ for managed Land)

Climat, [CO₂], structure du sol, occupation du sol

Végétation naturelle
potentielle: 9 pfts

Pariries

Cultures annuelles
pluviales et irriguées:
12 cfts

3 plantations bioenergie

Phenologie

Pratiques agricoles

Production

céréales tempérées
riz
maïs
céréales tropicales
racines/tubercules tempérées
racines/tubercules tropicales
légumineuses
tournesol
soja
arachides
colza
canne à sucre

Données globales d'occupation du sol

+

=> Distribution spatiale annuelle des différentes cultures pluviales et irriguées [1700-2005] (Fader et al. 2010)

Dates de semis

4 types de saisonnalité: f(T), f(P), f(P&T), indifférent

Simulation de la date de semis pour les céréales tempérées: f(T), cultures d'hiver et cultures de printemps.

USDA vs. MIRCA2000,
(Bondeau et al. 2007, Waha et al. 2012)

Choix variétal

PHU: phenological heat unit ($^{\circ}\text{Cd}$)

paramétré en fonction de la date de semis

PHU pour les céréales tempérées

Profil LAI, croissance, rendement

Courbe d'évolution du LAI potentiel adaptée de SWAT (***Soil and Water Assessment Tool***, Arnold et al. 1994, Neitsch et al. 2005),

Croissance racinaire et indice de récolte inspiré de SWIM (***Soil and Water Integrated Model***, Krysanova et al. 2000, 2005),

4 pools pour les cultures:

- racines
- feuilles
- organes de récoltes
- tiges + réserves mobiles

Phénologie globale

Test de la phénologie simulée:

Saisonnalité du LPJmL-fPAR vs. FPAR satellitaire (GIMMS 1982-2000, *Myneni et al.1997*)

North US-Canada (lu:62)
temp.cer.(59) - grazing (24)
raps (8) - corn (6)

Pakistan (lu:98)
temp.cer.(59) - grazing (26)
rice (15)

normalized distances

Exemple de mauvaise représentation d'un système agricole

Flux de CO₂

GPP, Respiration de l'écosystème (autotrophique + hétérotrophique), flux net
 Simulations LPJmL + données d'Eddy Covariance

Canicule 2003

Canicule 2003

Anomalies de la température et de précipitation (Vetter et al. 2008).

=> Anomalies des flux de carbone et d'eau

NEP

Biomasse

Réduction du stock de carbone dans la végétation due au changement d'occupation des sols

VEGC total vegetation carbon [1961-1990] LPJ(potential)

[1991-2000]

organic carbon stocks difference (kgC/m²)

LPJmL-LPJ

Rendements

temperate cereals 1991-2000

pluvial

pluvial +
irrigué

Evaluation des rendements

wheat yields, 1996-2000 lai_alphaA

LPJmL wheat yields, 1996-2000 lai_alphaA

LPJmL wheat best LAImax

FAO wheat yields, 1996-2000

(Christoph Müller)

Fertilisation CO_2

Conditions humides

Conditions arides

$[\text{CO}_2]$ élevée (futur)

(Dieter Gerten, PIK)

=> fertilisation CO_2

Les impacts négatifs de O_3 sont réduits sous une augmentation de CO_2

Importants débats autour de sa quantification

Changement climatique

Vulnérabilité des agriculture nationales face au changement climatique

% changement projeté des récoltes des 11 cultures principales:
[2046-2055] vs. [1996-2005]

3 SRES x 5 GCMs,

avec et sans fertilisation CO₂

Le changement climatique va vraisemblablement réduire les récoltes dans la plupart des pays en 2050, d'après les pratiques agricoles courantes et les variétés utilisées.

Müller et al. (*World Bank 2009*)

Couplage - modèle LUC

(Lotze-Campen et al., 2008, 2010)

Model of Agricultural Production and its Impact on the Environment

Structure du Modèle

- [*i*] régions économiques (10)
- [*j*] cellules spatiales (2178, 3° résolution ~ 300x300km)
- [*k*] activités (32): culture, élevage, irrigation, biofuels, etc
- [*m*] contraintes: limites biophysiques, rotations, bilan économique

Contraintes biophysiques (LPJ)
terre, eau, climat

Rendements (LPJmL)

Contraintes socio-économiques (GTAP, FAO)
demande, coûts structurels

Algorithme d'optimisation (Linear Programming) [LP]

Minimisation des coûts de production, sous des contraintes économiques et environnementales

occupation du sol dans les cellules de LPJ mL (%)

Autres sorties du modèle

- production
- utilisation d'intrants, main d'oeuvre
- coûts (terre, eau)
- échanges entre les régions

Disponibilité en eau

Probabilité de manque d'eau pour la production alimentaire en 2080.

- a) changement climatique (CC)
- b) CC et augmentation de la population (P)
- c) CCP, CO₂ et moins de viande

(Gerten et al. 2011)

Adaptation au changement climatique

Choix du système de culture:

Système de cultures multiples minimisant les pertes de rendement entre 2070–2099 et 1971–2000 (Waha et al. 2013)

single cropping systems

- wheat
- rice
- maize
- cowpea
- cassava
- groundnut

sequential cropping systems

- wheat-maize
- rice-rice
- rice-maize
- maize-wheat
- maize-rice
- maize-maize
- cassava-maize
- cassava-cowpea
- groundnut-rice
- groundnut-maize
- groundnut-cassava
- maize-groundnut

Agriculture pluviale

Potentialités pour augmenter la productivité de l'agriculture pluviale à l'aide de pratiques agricoles "simples" (Rost et al. 2009)

OT-Med

Labex OT-Med

(Objectif Terre : Bassin Méditerranéen)

- Fonctionnement des systèmes socio-écologiques Méditerranéens (passé, présent, futur)
- Observations + modélisation pour une estimation des services écosystémiques des écosystèmes marins et terrestres en interaction avec les sociétés humaines

2012-2020

Agrosystèmes méditerranéens

- nombreuses cultures pérennes
- diversité de l'assolement
- présence d'infrastructures agroécologiques
- maintien de pratiques traditionnelles ou choix de systèmes innovants (agroécologiques)

=> meilleure conservation de la biodiversité

=> meilleure utilisation de l'agrobiodiversité fonctionnelle

Ajout de 10 cfts

- Fichier historique de land use
- 1ère paramétrisation et
- implementation dans le code

=> représentation de 75% des cultures, dont les grandes consommatrices d'eau

Fader et al. (in prep)

Demande en eau pour l'irrigation

Demande en eau par ha

Demande absolue en eau: 90 km^3
 $\Rightarrow 187 \text{ km}^3$ nécessaire
 $\Rightarrow 105 \text{ km}^3$ si irrigation goutte à goutte

Fader et al. (*in prep*)

Contexte méditerranéen

1) le stress hydrique va augmenter

Changement climatique. Europe 1980-1999 to 2080-2099. Simulations MMD-A1B, 21 models ensemble (IPCC, 2007)

2) certaines pratiques sont non durables

Erosion, vigne, Vaucluse (Llewellyn 2006)

Salinisation, verger, Sicile (Crescimanno 2004)

No Data 0 - 2 2 - 20 20 - 100 100 - 300

Dépletion des réserves souterraines en eau, année 2000 (mm/yr) (Wada et al. 2010)

Contexte méditerranéen

LPJmL avec les cfts
Méditerranéens:
monocultures
(cultures intermédiaires,
incorporation des résidus)
=> impacte la matière organique
du sol mais pas de rétroaction

Une grande variété de pratiques innovantes

Ces pratiques:

- réduisent les labours
- augmentent la couverture du sol
- augmentent les intrants de carbone
- augmentent la diversité des cultures et les associations

⇒ changement des propriétés physiques, chimiques, et biologiques des sols.
⇒ augmentation de la matière organique du sol, de la capacité des sols à absorber et à garder l'eau, de la diversité biologique, et de la fertilité du sol.
⇒ augmentation ou maintien des rendements avec une moindre demande en eau, et une plus importante séquestration du carbone.

(thèse OT-Med Simon Decock)

Biodiversité

En région méditerranéenne, de nombreuses pratiques traditionnelles et/ou innovantes concernent la diversité au niveau du paysage (de la ferme) et impactent la biodiversité spécifique et fonctionnelle.

- infrastructures agroécologiques: haies, arbres isolés, bandes fleuries,
- faibles niveau d'intrants chimiques
- agroforesterie

Agrobiodiversité / Services écosystémiques

Un enjeu particulier:
Comprendre les interactions
entre Agriculture et Biodiversité

Forçages climatiques et
socio-économiques

Peut-on maintenir un système de
production agricole
viable, durable, résiliant?
Quel est le rôle de la biodiversité?

Famille des modèles LPJ-DGVM

DGVM: Dynamic Global Vegetation Model (pattern + process)

LPJ (Sitch et al. 2003)

- végétation naturelle
- code Fortran, maintenance à Bern (Bern-CC model)

LPX (Prentice et al. 2011)

- végétation naturelle + SPITFIRE + methane/permafrost
- code Fortran, maintenance?

LPJ-GUESS (Smith et al. 2001)

- végétation naturelle + cultures (LPJmL)
- représentation de la compétition entre individus: classes d'âge, cohortes.
- paramétrisation possible au niveau de l'espèce
- code C++, maintenance à Lund

LPJmL (Bondeau et al. 2007)

- végétation naturelle + agriculture + bioénergie + SPITFIRE
- intégration dans le modèle intégré d'impacts MAgPIE
- code C, maintenance à Potsdam

Distribution de la
végétation,
échanges d'eau
et de carbone