Dégradation des sols par mise en culture : impacts sur les matières organiques à l'échelle des complexes organo-minéraux

P. Bonnard, I. Basile-Doelsch, J. Balesdent, D. Borschnek

Jeudi 1^{er} Octobre 2009

Intérêt de l'étude

Modélisation de la distribution du C anthropique (1920-2100)

Evolution du C organique après mise en culture

Dynamique du carbone organique

Six et al. 2002

Mécanismes de stabilisation de la matière organique (MO) des sols :

- **Protection physique** : les agrégats protègent physiquement la MO en formant des barrières physiques entre les microbes / enzymes et leur substrat
- **Stabilisation biochimique** : stabilisation des composés organiques liée à leur propre récalcitrance à la minéralisation
- **Stabilisation physico-chimique** : MO est liée par les liaisons chimiques aux surfaces des minéraux du sol (*Torn et al., Nature 1997*)

Modèle conceptuel des interactions organo-minérales

OBJECTIFS

Kleber et al., 2007

Objectifs :

- Quelles sont les phases minérales stabilisatrices des MO ?
- Quelle est la sensibilité des associations organo-minérales à la mise en culture ?
- Quelle est la nature des interactions ?

Les sols

Acrisol

MO 9.5 %

Arrouays, 1995

La chrono-séquence « Lacadée » :

1- méthode indirecte :

- **extraction des minéraux du sol**
- **analyse des MO associées (ou non associées)**

2- méthode directe :

- **travailler in situ sans perturber le sol**

La méthode indirecte

1- Extraction des minéraux du sol :

Diffraction des rayon X

Résultats : Teneur en carbone organique

2- Analyse des MO associées :

$$f = \frac{(\delta^{13}\text{C} - \delta^{13}\text{C}_{\text{Forêt}})}{(\delta^{13}\text{C}_{\text{Maïs}} - \delta^{13}\text{C}_{\text{Forêt}})}$$

Résultats : Dynamique du carbone organique

1- Conclusion :

- Identification d'une fraction accumulatrice de carbone (AlSiPc)
- Dynamique du carbone différentes en fonction de la nature des minéraux
- Mise en culture :
 - diminution des associations organo-minéral
 - augmentation de la dispersion des minéraux

2- Perspectives :

Projet INSU EC2CO Cytrix déposé le 25 sept

- valider ou invalider par la Sims :
 - les distances des interactions organo-minérales
 - l'Hypothèse des AlSiPc
- estimer la réversibilité des phénomènes

La méthode direct : NanoSims

Matériel

Herrmann et al. 2007

- Résolution latérale : 50 à 150 nm
- Analyse des concentrations au ppm
- Mesure de 5 à 7 masses

Résultats attendus et objectifs

➤ exemple d'application : *Biologie NanoSims*

➤ Objectifs

- Imagerie chimique à nano-échelle
- Localisation des composés organiques sur échantillon non perturbé
- Variabilité de la nano-structure en fonction du type de sol ?
- Modification de la nano-structure après mise en culture ?

La NanoSims

➤ Préparation des échantillons :

Etape 1 : Inclusion en résine polyester

Etape 2 : Découpe à la scie (fil en diamant)

Etape 3 : Analyses en micro-fluorescence X + MEB

■ Fe

■ Si

3 mm

2 μm

Etape 4 : Coupe FIB

20 x 5 μm x 500 nm

La NanoSims

➤ Résultats :

Etape 5 : NanoSims

8.6 µm

9.4 µm

9.4 µm

- Oxydes de Fe 1, plaqués sur les membranes des cellules
- Oxydes de Fe 2, cristallisés à l'intérieur des cellules
- Argiles
- Matière Organique 1, constitutive des cellules
- Matière Organique 2, riche en azote (?), mêlée aux oxydes de Fer situés en position externe

Projet INSU EC2CO Cytrix déposé le 25 sept

Cycle des matières organiques dans les sols naturels et anthropisés : constituants et processus à nano-échelle

Mots clés :

Echantillons naturels / structure nano-échelle / types de sols « mineralo-varies »

Agrosystemes : perturbation mise en culture